

しょうせいりゅうとう

小青竜湯 A エキス細粒「分包」三和生薬

小青竜湯Aエキス細粒「分包」三和生薬は、漢方処方「小青竜湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたもので



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（感冒に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	1 包
7才～14才	2/3 包
4才～6才	1/2 包
4才未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品1日量 3包（1包2.0g）中
小青竜湯エキス（7/10量） 4.0g

マオウ	2.1 g	ケイヒ	2.1 g
シャクヤク	2.1 g	サイシン	2.1 g
カンキョウ	2.1 g	ゴミシ	2.1 g
カンゾウ	2.1 g	ハング	4.2 g

上記の生薬より抽出したエキス

添加物として乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わること。）
- * (4) 1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

株式会社虎ノ門堂 お客様相談室

〒174-0072 東京都板橋区南常盤台1丁目21-4

TEL 03-5965-6721(代)

(月～金曜日 9:30～18:00 但し祝日を除く)

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもあります、効能・効果にはかわりございません。

発 売 元



株 式 会 社 虎 ノ 門 堂

東京都港区虎ノ門2丁目2-5 共同通信会館1階

製造販売元



三 和 生 薬 株 式 会 社

栃木県宇都宮市平出工業団地6-1

適応症

体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るもの次の諸症：

気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症