

アコニンサン糖衣錠

アコニンサン糖衣錠は加工ブシ末を飲みやすい糖衣錠にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	動悸、のぼせ、ほてり、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 乾燥剤は捨てないこと。また、誤って飲み込まないようにすること。

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

株式会社虎ノ門堂 お客様相談室
〒174-0072 東京都板橋区南常盤台1丁目21-4
TEL 03-5965-6721 (代)
(月～金曜日 9:30～18:00 但し祝日を除く)

適応症

鎮痛 強心 利尿

用法・用量

次の1回量を1日3回 服用すること。

年 令	1 回 量
大人(15才以上)	3錠
15才未満	服用しないこと

*成 分

本品1日量 …… 9錠(1錠0.4g)中
加工ブシ末 …… 1800.00mg

添加物としてトウモロコシデンプン、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Ca、ヒプロメロース、マクロゴール6000、タルク、白糖、沈降炭酸Ca、ゼラチン、アラビアゴム末、酸化チタン、カルナウバロウを含有する。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。

発 売 元



株式会社虎ノ門堂

東京都港区虎ノ門2丁目2-5 共同通信会館1階

製造販売元



三和生薬株式会社

栃木県宇都宮市平出工業団地6-1