

ロクジョン

ろくじょうたい ほうとう
鹿茸大補湯

ロクジョンは、漢方処方「鹿茸大補湯」のエキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	動悸、のぼせ、ほてり、口唇・舌のしびれ

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

適応症

身体が衰弱し、やせて皮膚が乾燥して貧血食慾不振を呈するもの。

補血・健胃強壮・食慾増進・疲労回復・神経痛
・関節炎・肩こり・冷症。

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人(15才以上)	6錠
15才未満	服用しないこと

成 分

本品1日量 …………… 18錠(1錠0.3g)中

(ロクジョウ …………… 0.576g)
(ニンジン …………… 0.72g)

上記の生薬より抽出したアルコール製エキス ……0.432g

ニクジュヨウ … 0.576g ゴミシ …………… 0.432g
 ジュクジオウ … 0.576g ハンゲ …………… 0.432g
 トチュウ …………… 0.576g オウギ …………… 0.432g
 シャクヤク …… 0.576g ブクリョウ …… 0.432g
 ビヤクジュツ … 0.576g タイソウ …………… 0.432g
 トウキ …………… 0.576g カンゾウ …………… 0.432g
 セッコク …………… 0.432g ショウキョウ … 0.288g

上記の生薬より抽出した水製エキス … 2.592g
 加工ブシ末 …………… 0.576g

添加物として乳糖、セルロース、アルファー化デンプン、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Ca、トウモロコシデンプン含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 乾燥剤は捨てないこと。また、誤って飲み込まないようにすること。

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

株式会社虎ノ門堂 お客様相談室

〒174-0072 東京都板橋区南常盤台1丁目21-4

TEL 03-5965-6721 (代)

(月～金曜日 9:30～18:00 但し祝日を除く)

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。

発 売 元



株式会社虎ノ門堂

東京都港区虎ノ門2丁目2-5 共同通信会館1階

製造販売元



三和生薬株式会社

栃木県宇都宮市平出工業団地6-1